




AFASIA

■ Papel do Terapeuta da Fala

A avaliação, o diagnóstico e a intervenção na pessoa com Afasia é realizado pelo Terapeuta da Fala.

O principal objetivo da intervenção é permitir à pessoa com Afasia lidar e ultrapassar a sua incapacidade e tornar-se o mais autónomo possível.

Cabe ao Terapeuta da Fala ajudar a pessoa a recuperar a capacidade de comunicação até ao máximo que a sua lesão cerebral permita, bem como capacitar os seus familiares a lidar com a sua nova condição.



Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano
Monte do Gilbardinho 7540 – 230 Santiago do Cacém
Tel: +351 269 818 100 Fax: +351 269 818 156

Aceda às nossas orientações através dos folhetos disponíveis no QR Code ou no link facultado e, caso pretenda, solicite-os no formato físico na sua unidade de saúde da ULSLA“
www.ulsla.min-saude.pt/downloads/folhetos



ULSLA/GCI/JULHO2024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LITORAL ALENTEJANO

Terapia da Fala



Afasia
o que
é

AFASIA



O que é

É uma perturbação adquirida da linguagem, decorrente de uma lesão neurológica focal no hemisfério dominante para a linguagem, sendo a mais frequente, o Acidente Vascular Cerebral (AVC).

35% dos doentes com AVC têm Afasia.

Alterações


As perturbações da comunicação são muito frequentes após um AVC.

Podem manifestar-se dificuldades nas componentes:

- **oral** | **leitura** | **escrita**

- **expressão** | **compreensão**

Assim, podem surgir alterações na escrita, fala, capacidade de utilizar gestos, no canto, operações matemáticas e até na atribuição de significado a informação simbólica, como por exemplo, sinais de trânsito, lidar com dinheiro ou jogos de cartas.




Tipos de Afasia

Existem 8 tipos de Afasia:

- Global
- de Broca
- Transcortical Motora
- Transcortical Mista
- de Wernicke
- de Condução
- Anómica
- Transcortical Sensorial

Dependendo do desempenho da pessoa em provas de nomeação, fluência, compreensão verbal oral simples e repetição, assim se diagnostica o tipo de Afasia, com diferentes graus de gravidade

Impacto



As sequelas de Afasia têm um impacto negativo substancial na qualidade de vida da pessoa com afasia e seus familiares, limitando a sua capacidade de comunicar e interagir socialmente.

São muito frequentes alterações do humor e distúrbios emocionais na pessoa com Afasia, podendo ter um impacto negativo na reabilitação do utente. As alterações mais observadas após um AVC são depressão, ansiedade, labilidade emocional e propensão à raiva e fadiga.