

Perturbações dos Sons da Fala

Impacto

As PSF podem condicionar a interação e a participação da criança nas atividades do dia-a-dia, tornar o seu discurso mais impercetível, levar a dificuldades emocionais e comportamentais e ter consequências negativas no aproveitamento escolar e nas competências sociais.

Existe uma relação muito estreita entre a fala e a linguagem escrita (leitura e escrita), uma vez que ambas assentam (entre outros fatores) nas competências linguísticas da criança.

A presença de uma PSF pode ser um sinal de alerta para uma possível dificuldade futura na aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita.

Papel do Terapeuta da Fala

O Terapeuta da Fala é o profissional indicado para a deteção de uma PSF, através de uma avaliação e intervenção terapêutica dirigida às dificuldades e competências apresentadas pela criança, fomentando o trabalho de equipa através do uso de estratégias adequadas entre todos os cuidadores da criança.

É fundamental que as PSF sejam detetadas o mais precocemente possível.

Contactos

Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano
Monte do Gilbardinho 7540 – 230 Santiago do Cacém
Tel: +351 269 818 100 Fax: +351 269 818 156

Aceda às nossas orientações através dos folhetos disponíveis no QR Code ou no link facultado e, caso pretenda, solicite-os no formato físico na sua unidade de saúde da ULSLA”
www.ulsla.min-saude.pt/downloads/folhetos



ULSLA/GC/ULH/02024



UNIDADE LOCAL DE SAÚDE
LITORAL ALENTEJANO

Terapia da Fala

Perturbações
dos
Sons
da Fala

Perturbações dos Sons da Fala

O que é a Fala?

A fala é uma atividade complexa que recorre à articulação de sons de uma língua, para expressar a linguagem oralmente.



Assim, a produção correta dos sons da fala depende do planeamento motor e execução motora (dos órgãos fonoarticulatórios, tais como os lábios, língua, dentes, palato, laringe, etc.) e das competências linguísticas (isto é, o conhecimento acerca dos aspetos da sua língua, que permite usá-la e compreendê-la).

O que são Perturbações dos Sons da Fala (PSF)?

As crianças com uma perturbação dos sons da fala apresentam lacunas no seu sistema de sons que podem provocar uma dificuldade em produzir e/ou compreender os sons da fala.

Há “erros” presentes na produção da fala que são normais no desenvolvimento fonológico (i.e., dos sons da fala). No entanto, há outras situações em que estes “erros” podem indicar um atraso ou um desvio no desenvolvimento fonológico.

As PSF são das alterações mais frequentemente detetadas na infância.

Perturbações dos Sons da Fala

Tipos de PSF

De acordo com o perfil linguístico da criança, podemos estar perante diferentes tipos de PSF, nomeadamente:

Perturbação Articulatória

Erros relacionados com aspetos anatomofisiológicos, como por exemplo, má oclusão dentária, freio lingual curto, alteração de motricidade orofacial dos órgãos articuladores, hábitos de uso prolongado de chupeta, sucção digital.

Atraso Fonológico

Quando os “erros” de produção são típicos do desenvolvimento normal, mas em idades cronológicas anteriores.

Perturbação Fonológica (consistente ou inconsistente)

Quando há produção de “erros” típicos do desenvolvimento linguístico de idades cronológicas anteriores, e atípicos.

Dispraxia Verbal do Desenvolvimento

Padrão semelhante à perturbação fonológica inconsistente, mas com diferente sintomatologia e gravidade.

Causas



As dificuldades de produção dos sons da fala podem surgir devido a um fator isolado ou a uma combinação de fatores, entre os quais se destacam aspetos : fonéticos (articulação), fonémicos (cognitivo-linguístico), estruturais (craniofacial), perceptuais (ex: alterações das competências auditivas) ou neuro-motores (planeamento e/ou coordenação para a execução dos movimentos para a produção da fala).